

### **GUIAS DE EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL** (GEMO-008)

# **GUIA TECNICA PARA LA LECTURA DE** RADIOGRAFIAS DE TORAX UTILIZANDO LA **CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LA OIT DE RADIOGRAFIAS DE NEUMOCONIOSIS 2000**



Lima Perú 2008

Ministerio de Salud Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz Ministro de Salud

Instituto Nacional de Salud Dra. Patricia García Funegra Jefa Institucional

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud Dra. Miriam E. Vidurrizaga Ramos

Directora General

Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo Psic. Juan Cossío Brazzan Director Ejecutivo

Material transcrito y adaptado de:

"Guía para el Uso de la Clasificación Internacional de la OIT de Radiografías de Neumoconiosis" Edición revisada, 2000

Transcrita y adaptada por Dr. Jonh M. Astete Cornejo Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud

# 3.4. GUIA TECNICA PARA LA LECTURA DE RADIOGRAFIAS DE TORAX UTILIZANDO LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LA OIT DE RADIOGRAFIAS DE NEUMOCONIOSIS 2000

#### 3.4.1 FINALIDAD

La Clasificación de la OIT ofrece un medio para describir y registrar sistemáticamente las anormalidades radiográficas de tórax provocadas por inhalación de polvo. Se usa para describir las anormalidades radiográficas observadas en cualquier tipo de neumoconiosis que ha concebido para clasificar únicamente las imágenes observadas en radiografías de tórax posteroanteriores. La evaluación clínica de los sujetos puede exigir el uso de otras proyecciones y técnicas de diagnostico por imagen, pero la Clasificación Internacional de la OIT no se ha diseñado para codificar esos datos.

#### 3.4.2 OBJETIVO

Estandarizar la lectura de radiografías de tórax en Perú utilizando la Guía para el Uso de la Clasificación Internacional de la OIT para Radiografías de Neumoconiosis 2000.

#### 3.4.3 AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica es aplicable a todos los establecimientos de salud públicos y privados incluyendo a Essalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú que realicen evaluaciones médico ocupacionales a los trabajadores de todos los sectores económicos, bajo el régimen laboral de la actividad pública y privada, en todo el territorio nacional.

#### 3.4.4 PROCESO O PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR

"Guía para el Uso de la Clasificación Internacional de la OIT de Radiografías 2000"

#### 3.4.5 CONSIDERACIONES GENERALES:

Tomado y adaptado de las Instrucciones Generales de la "Guía para el Uso de la Clasificación Internacional de la OIT de Radiografías 2000"

Ninguna característica radiográfica es patognomónica de la exposición a polvo. Algunas características radiográficas que no están relacionadas con la inhalación de polvo pueden simular aquellas causadas por esta. Los lectores de radiografías pueden discrepar en la interpretación de estas imágenes.

Es necesario que se describan todas las imágenes observadas, utilizando la simbología propuesta, además de realizar los comentarios necesarios cuando se de el caso.

#### REQUERIMIENTOS BASICOS:

- RECURSOS HUMANOS: La lectura de radiografías con técnica OIT deben ser hechas por cualquiera de los siguientes profesionales que deben ser certificados previamente por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD-CENSOPAS con técnica OIT:
- Medico con post grado en Salud Ocupacional debidamente certificado.
- Medico Neumólogo debidamente certificado.
- Medico Radiólogo debidamente certificado.

#### o MATERIALES:

- Serie de 22 radiografías estándar OIT revisión 2000.
- Negatoscopio de 2 cuerpos o más.

#### 3.4.6 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Tomado de las Instrucciones Especificas de la "Guía para el Uso de la Clasificación Internacional de la OIT de Radiografías 2000"

#### 3.4.6.1. DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO

#### a. Calidad Técnica:

Se consideran cuatro grados de calidad técnica:

- Buena
- 2. Aceptable: Sin defectos Técnicos que afecten a la clasificación de la radiografía para neumoconiosis.
- 3. Aceptable: Con algún defecto técnico pero aun adecuada para fines de clasificación.
- 4. Inaceptable: para fines de clasificación.

#### b. Anormalidades Parenquimatosas

Las anormalidades parenquimatosas consisten en opacidades pequeñas y opacidades grandes.

#### Opacidades Pequeñas

Las opacidades pequeñas se describen por la profusión, las zonas afectadas del pulmón, la forma (redondeada o irregular) y el tamaño. El orden seguido para identificar y registrar la presencia o ausencia de estas anormalidades al clasificar una radiografía se deja a criterio del lector.

#### Profusión

Se entiende por profusión de opacidades pequeñas la concentración de estas en las zonas afectadas del pulmón. La categoría de la profusión se basa en la comparación con las radiografías estándar. Para la profusión, las descripciones escritas son una guía, pero las radiografías estándar prevalecen. Ellas definen cuatro categorías. La profusión es clasificada en una de 12 categorías que se representan simbólicamente como se muestra a continuación.

Profusión creciente de opacidades pequeñas												
Categorías		0			1			2			3	
Subcategorías	0/-	0/0	0/1	1/0	1/1	1/2	2/1	2/2	2/3	3/2	3/3	3/+

La categoría 0 se refiere a la ausencia de opacidades pequeñas o a la presencia de opacidades pequeñas menos profusas que en la categoría 1.

La clasificación de una radiografía según la escala de 12 subcategorías se realiza de la manera siguiente:

- Se selecciona la categoría adecuada comparando la radiografía del sujeto con las radiografías estándar que definen los niveles de profusión

característicos de las subcategorías centrales (0/0, 1/1, 2/2, 3/3) de las categorías.

- La categoría se registra escribiendo el símbolo correspondiente seguido de una barra inclinada, es decir: 0/, 1/, 2/, 3/.
- Si no se ha considerado seriamente clasificar la radiografía en otra categoría, se la clasifica en las subcategorías centrales, es decir: 0/0, 1/1, 2/2 o 3/3.
- Las radiografías estándar ofrecen ejemplos de imágenes clasificables como subcategoría 0/0. Esta se refiere a radiografías en las que no se observan opacidades pequeñas o en las que existe un pequeño número, pero no son lo bastante definidas o numerosas para que se haya considerado seriamente como alternativa la clasificación en la categoría 1. La subcategoría 0/1 se utiliza en las radiografías clasificadas en la categoría 0 tras haberse considerado seriamente como alternativa la categoría 1. La subcategoría 1/0 se utiliza para las radiografías clasificadas como categoría 1 tras haberse considerado seriamente como alternativa la categoría 0. Si la ausencia de opacidades pequeñas es particularmente evidente, la radiografía se clasifica en la subcategoría 0/-.
- Una radiografía que muestre una profusión muy superior a la descrita en la radiografía estándar de la subcategoría 3/3 clasifica como subcategoría 3/+.

#### Zonas afectadas del Pulmón

Se registran las zonas en las que se observen opacidades. Cada campo pulmonar se divide en tres zonas (superior, media e inferior) mediante líneas horizontales trazadas a aproximadamente un tercio y dos tercios de la distancia vertical entre los vértices pulmonares y las cúpulas diafragmáticas.

La profusión global de opacidades pequeñas se determina considerando la profusión como un todo en las zonas afectadas del pulmón. Cuando el grado de profusión difiere mucho (tres subcategorías o más) entre zonas pulmonares, al clasificar la profusión global no se tienen en cuenta la zona o zonas con un grado notablemente menor de profusión.

#### Forma y Tamaño

En el caso de la forma y tamaño, las definiciones escritas son orientativas y las radiografías estándar prevalecen. Se registran el tamaño y la forma de las opacidades pequeñas. Se identifican dos tipos de formas: redondeadas e irregulares. En cada caso se distinguen tres tamaños.

En el caso de las opacidades redondeadas y pequeñas, los tres tamaños se indican con las letras p, q, y r, y se definen por la apariencia de las opacidades pequeñas en las radiografías estándar correspondientes. Estas muestran:

- p: opacidades de hasta 1,5mm de diámetro.
- q: opacidades de diámetros mayores a 1,5mm y hasta 3 mm;
- r: opacidades de diámetros mayores a 3 mm y hasta 10 mm.

Los tres tamaños de las opacidades irregulares pequeñas se indican con las letras s, t y u, y se definen por la apariencia de las opacidades pequeñas en las radiografías estándar correspondientes. Estas muestran:

- s: opacidades de hasta 1.5mm de ancho.
- t: opacidades que exceden 1,5mm y alcanzan hasta 3 mm de ancho;
- u: opacidades que exceden 3 mm y alcanzan hasta 10 mm de ancho.

El registro de la forma y tamaño se deben utilizar dos letras, ósea si el lector considera una sola forma y un solo tamaño de las opacidades observadas especificara las dos letras separadas por una barra por ejemplo q/q, si el lector observa opacidades del mismo tamaño y diferente forma colocara primero las opacidades que observa significativamente seguida de las que son menos significativas por ejemplo q/t; en caso las opacidades sean mas significativas un tamaño que otro el mas significativo observado se colocara primero seguido del observado secundario por ejemplo q/r.

Las opacidades grandes se definen como aquellas cuya dimensión mayor supera los 10 mm. Las categorías de opacidades grandes se definen a continuación. Estas definiciones prevalecen sobre los ejemplos de opacidades grandes que se muestran en las radiografías estándar.

- Categoría A: Una opacidad grande cuya dimensión mayor llega hasta los 50 mm, o varias opacidades grandes cuyas dimensiones mayores suman hasta 50 mm.
- Categoría B: Una opacidad grande cuya dimensión mayor supera los 50mm pero no supera el área equivalente de la zona superior derecha, o varias opacidades grandes cuyas dimensiones mayores suman más de 50mm pero no superan el área equivalente de la zona superior derecha.
- Categoría C: Una opacidad grande que supera el área equivalente de la zona superior derecha, o varias opacidades grandes que, en conjunto, superan el área equivalente de la zona superior derecha.

#### c. Anormalidades Pleurales

Las anormalidades pleurales se dividen en placas pleurales (engrosamiento pleural localizado), obliteración del ángulo costofrénico y engrosamiento pleural difuso.

#### Placas Pleurales (engrosamiento pleural localizado)

Las placas pleurales representan engrosamientos localizados de la pleura, generalmente de la pleura parietal. Pueden observarse en el diafragma, la pared torácica (presentadas de perfil o de frente) y otras localizaciones. En ocasiones se identifican únicamente por estar calificadas. Se registran como ausentes o presentes; si están presentes en la pared torácica, se registran como presentadas de perfil o de frente, y por separado para el hemitorax derecho y el izquierdo. Las placas pleurales presentadas de perfil deben tener un ancho mínimo de 3 mm para registrarse como presentes.

La localización, calcificación y extensión de las placas pleurales se registraran por separado para el hemitorax derecho y el izquierdo. Las directrices escritas que describen estas características prevalecen sobre los ejemplos proporcionados en las radiografías estándar.

#### Sitio

Los sitios donde se observan las placas pleurales incluyen la pared torácica, el diafragma y otros sitios. "Otros sitios", incluyen la pleura mediastínica en las localizaciones paraespinales o paracardiacas. Se registrara la presencia o ausencia de placas pleurales para todos los sitios, y separadamente para los lados derecho e izquierdo.

#### Calcificación

Las imágenes radiográficas de las placas pleurales pueden incluir zonas identificables de calcificación. Se registrara en todas las localizaciones la presencia o ausencia de calcificación, y por separado para el hemitorax derecho y el izquierdo. Cuando se observe la clasificación, se registrara también la presencia de una placa en esa localización.

#### Extensión

No se registrara la extensión de las placas situadas sobre el diafragma o en otros sitios. Solo se registrara la de las ubicadas a lo largo de la pared torácica, y se combinara para las dos variedades de presentación, de perfil y de frente. La extensión se define por la longitud total de la lesión con respecto a la proyección de la pared lateral del tórax (desde el vértice hasta el ángulo costofrenico) en la radiografía del tórax posteroanterior:

- 1= longitud total hasta de una cuarta parte de la proyección de la pared lateral del tórax:
- 2=longitud total que excede una cuarta parte y no supera la mitad de la proyección de la pared lateral del tórax.
- 3=longitud total que excede la mitad de la proyección de la pared lateral del tórax.

#### Obliteración del Angulo Costofrenico

La obliteración del ángulo costofrenico se registrara como presente o ausente, y por separado para el hemitorax derecho y el izquierdo. El limite inferior para registrar la obliteración del ángulo costofrenico se define por la radiografía estándar que muestra la subcategoría de profusión 1/1 t/t. Si el engrosamiento pleural se extiende por la pared lateral del tórax desde el ángulo costofrenico obliterado, el engrosamiento se clasificara como engrosamiento pleural difuso. Puede producirse la obliteración del ángulo costofrenico sin engrosamiento pleural difuso.

#### • Engrosamiento Pleural Difuso

Tradicionalmente, la denominación "engrosamiento pleural difuso" se ha referido al engrosamiento de la pleura visceral. La distinción radiográfica entre el engrosamiento de la pleura parietal y el de la pleura visceral en una radiografía posteroanterior no siempre es posible.

Para los fines de la clasificación de la OIT 2000, un engrosamiento pleural difuso que se extienda por la pared lateral del tórax solo se registrara si coexiste con la obliteración del ángulo costofrenico y es continuación de ella. El engrosamiento pleural difuso se registrara como ausente o presente a lo largo de la pared torácica. Si está presente, se registrara como de perfil o de frente, y por separado para el hemitorax derecho y el izquierdo. Su extensión se hará constar igual que en el caso de las placas pleurales. Para registrar la presencia de un engrosamiento pleural difuso de perfil, el ancho mínimo debe ser de 3mm. Si se necesita medir con exactitud el ancho para un estudio en particular. La calcificación y la extensión de un engrosamiento pleural difuso en la pared torácica se registraran por separado para el hemitorax derecho y el izquierdo. A menudo pueden verse la pleura en el vértice del pulmón; no se registrara como parte de un engrosamiento pleural difuso de la pared torácica.

#### d. Símbolos

Se enumeran a continuación los símbolos para registrar las características radiográficas de importancia. Su uso es relevante porque describen características adicionales relacionadas con la exposición a polvo y otras etiologías. El uso de estos símbolos es obligatorio, ya que la incorporación de esta información a los análisis estadísticos de los resultados puede ayudar a justificar las variaciones entre lectores, observadas al clasificar las mismas radiografías y que de otro modo no podrían explicarse.

Algunos de los símbolos no suponen meras descripciones, sino interpretaciones de lo que se ve en la radiografía. Por si sola, una radiografía posteroanterior de tórax puede no ser suficiente para justificar una interpretación definitiva; por consiguiente, cada una de las definiciones siguientes de los símbolos se acompaña implícitamente de una palabra o una frase introductoria de tipo calificativo, como "alteraciones indicativas de", "opacidades que sugieren" o "sospecha de". Los símbolos son:

aa	Aorta ateroesclerótica
at	Engrosamiento pleural
ax	Coalescencia de opacidades pequeñas
bu	Bula(s)
са	Cáncer: tumores malignos torácicos, excluido el mesotelioma
cg	Adenopatías o nódulos (por ejemplo, granulomas) no neumoconióticos calcificados.
cn	Calcificación en opacidades neumoconióticas pequeñas.
СО	Anormalidad del tamaño o la forma del corazón
ср	Cor pulmonale
CV	Cavidad
di	Distorsión pronunciada de una estructura intratoraxica
ef	Derrame pleural
em	Enfisema
es	Calcificación en cascara de huevo de los ganglios linfáticos hiliares o mediastínicos
fr	Fractura(s) costal(es) (reciente(s) o consolidada(s)
hi	Adenopatías hiliares o mediastinicas no calcificadas
ho	Pulmón en panal de abeja
id	Diafragma mal definido
ih	Contorno cardiaco mal definido
kl	Líneas septales de kerley
me	Mesotelioma
ра	Atelectasias en placa
pb	Bandas parenquimatosas
pi	Engrosamiento pleural de una cisura interlobular
рх	Neumotórax
ra	Atelectasias redondeadas
rp	Neumoconiosis reumatoide
tb	Tuberculosis
od	Otra enfermedad o anormalidad significativa

#### GEMO-008/Guías de Evaluación Médico Ocupacional

Si la calidad de la radiografía no se registra como 1 (buena), entonces debe hacerse un comentario sobre ella antes de seguir con la clasificación

También se escribirán comentarios cuando se registre el símbolo od (otra enfermedad o anormalidad significativa) y para identificar la lectura de cualquier parte de una radiografía de tórax que, a juicio del lector, es probable o seguro que no se deba a la inhalación de polvo.

También se escribirán comentarios para aportar otras informaciones pertinentes.

#### 3.1.7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El uso adecuado de la Clasificación de la OIT exige buenas condiciones de observación y registro. Por lo que se recomienda que:

- Los negatoscopios para observar las radiografías que se desea clasificar y las radiografías estándar se situarán lo bastante cerca del observador para que éste pueda ver opacidades de sólo 1 mm de diámetro, es decir, a unos 250 mm de distancia. También es fundamental ver la radiografía completa.
- El observador estará cómodamente sentado.
- El número mínimo de espacios de observación es de dos, lo que permite comparar la radiografía del sujeto y las radiografías estándar. No obstante, se recomienda utilizar tres espacios de observación, de manera que pueda ubicarse la radiografía del sujeto entre las radiografías estándar adecuadas para evaluar la profusión. Es importante facilitar la selección y presentación de las radiografías estándar para efectuar la comparación, que es obligatoria.
- Las superficies de observación estarán limpias y la intensidad de la iluminación será uniforme en todas ellas. La sala dispondrá de una iluminación general tenue, sin luz de día directa, y será silenciosa, cómoda y sin distracciones.
- Al clasificar radiografías con fines epidemiológicos es fundamental que el lector no tenga en consideración ninguna otra información sobre los individuos estudiados. El conocimiento de detalles suplementarios sobre ellos puede introducir un sesgo en los resultados. Si el objetivo epidemiológico es establecer comparaciones entre dos o más grupos, se mezclarán las radiografías de todos ellos y se presentarán al lector en orden aleatorio. No seguir estos principios puede invalidar las conclusiones del estudio.
- Los resultados se registrarán de forma normalizada y sistemática. Es importante adoptar las medidas adecuadas para registrar explícitamente la presencia o ausencia de todas las características que deban evaluarse para un estudio en particular. Cuando el número de radiografías por clasificar sea muy grande, será muy útil contar con personal auxiliar que ayude a registrar los resultados. Se pedirá al asistente que señale al lector de las radiografías toda omisión al registrar la presencia o ausencia de elementos que deben analizarse en el estudio.
- El número de radiografías que es posible clasificar por unidad de tiempo varía mucho. Entre los factores que influyen en la velocidad de lectura se cuentan la calidad de las radiografías, la prevalencia en ellas de

#### GEMO-008/Guías de Evaluación Médico Ocupacional

anormalidades, la experiencia del lector, la finalidad de la lectura y la duración de la sesión de lectura.

- Se han constatado variaciones considerables entre las lecturas múltiples de algunas radiografías, no sólo de unos lectores a otros (variación entre observadores), sino también de unas lecturas a otras de un mismo lector (variación intra-observador). Se recomienda que en los estudios epidemiológicos haya al menos dos lectores (o más, de ser posible) que clasifiquen de forma independiente todas las radiografías.
- Cuando se vayan a leer muchas radiografías, la variación intra-observador (la variación en lecturas repetidas de una misma radiografía por un mismo lector) debería ser registrada.


#### 3.4.8. **ANEXOS**

Anexo 1. Diagrama ilustrativo de forma y profusión de opacidades.


**Anexo 2.** Algunos diagramas ilustrativos de uso de símbolos en hallazgos radiográficos.

Anexo 3: Formulario de Informe Radiográfico con Metodología OIT.

Anexo 1. Diagrama ilustrativo de forma y profusión de opacidades



Anexo 2. Algunos diagramas ilustrativos de uso de símbolos en hallazgos radiográficos



Anexo 3: Formulario de Informe Radiográfico con Metodología OIT

PLACA Nº					HCL					Lec	tor						
Nombre											Edad						
Fecha de							Fech	a de ra	diogra	afía							
Lectura	día	me	es a	año							día		me	es	Año		
	1	Bue	na		Cau	ısas	1	Sobre	expos	ción			5	Escap	oulas		
I. Calidad	2	Ace	ptable				2 Subexposicion						6	Artefa	icto		
Radiográfica	3	Baia	Calida	ad			3	Posición centrado					7	Otros			
<b>J</b>	4		eptable				4 Inspiración Insuficie				nto	+	•	0.00			
Comentario	1 -	L	сріаві	,			7	шэрп	CIOITI	isuiicic	IIIC						
defectos Técnicos	sobre	;															
II. ANORMALIDAD	ES D	A DEN	MILION	AZOSA	S (ci N	∩ hay a	oorma	lidados	naror	auimat	ocac r	1200	a III	۸ Dlo	ıraloc)	١	
					•						2.4						
<b>2.1. Zonas Afe</b> (marque TODAS las				otusion as)(esca		pacidades 2.3. Forma y Tamaño : de 12 (Consulte las radiografías							•	cidades i no ha			
afectadas)	20116		untos)		nsulte		•			ren dos	,	rque			y mingi	una o	
arcotadas)			adiograf	,	estándar		símbo		marqu			iquo	/  D	00			
			•		categorí			rio y un :									
			rofusiór														
Der.	Izq		0/-	0/0	0	)/1	Prin	naria	Sec	undaria				0			
Superior			1/0	1/1	1	1/2	р	S	р	S				Α			
Medio			2/1	2/2	2	2/3	q	t	q	t				В			
Inferior			3/2	3/3	3	3/+	r	u	r	u				С			
III. ANORMALIDAD	ES P	LEUR	RALES	(si NO	hay and	ormalida	des p	ase a s	ímbolo	s *)		SI		NC	)		
3.1. Placas Pleural	<b>es</b> (0:	=Ning	una, D	=Hemit	órax de	recho; I=	Hem	itórax i	zquier	do)							
					Ext	ensión	(pa	red	Toráci	ca; A	ncho (	opcio	onal)	)			
					con	nbinada	para p	olacas d	e perf	Iy (a	ncho	mínir	no e	xigido:	3 mm	1)	
					de f	frente)											
Sitio			Calci	ficación	1	l l		la pare	ed late	ral	, D	e 3 a	5 m	nm			
(Marque las	cas	sillas	(mare		<u> </u>	del	tórax										
adecuadas)			(111011	440)	2	2 Entre ¼ y ½ de la pared b						De 5 a 10 mm					
						late		l tórax									
					3			la pare	ed late	ral	:   M	layor	a 10	0 mm			
	1 _						tórax				4						
Pared 0	D	<u> </u>	0	D		0		) (	<b>)</b>			D	1				
Torácica de perfil						1	2	3 1	2	3	а	b	С	а	b	С	
De frente <b>0</b>	D		0	D											L		
Diafragma <b>0</b>	D	H	0														
Otro(s) sitio(s) <b>0</b>	D	H	0														
		netofr			0	D	T										
Obliteración del Angulo Costofrenico  O D I  3.2. Engrosamiento Difuso de la Pleura (0=Ninguna, D=Hemitórax derecho; l= Hemitórax izquierdo)																	
							+		D I								
De perfil 0	٦	+-	۲		-	1	2	3 1		3	a	b	С	a	b	С	
	D	ı	0	D	$\overline{}$	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	а	L		, <sub>I</sub> a	U	U	
Do fronto						SI I						NO					
De frente 0	<del></del>			(Rodee con un circulo la respuesta adecuada; si rodea od, escriba a continuación un COMENTARIO)													
IV. SIMBOLOS *	L		ooto o-	loous de	امما اما		oorib-		inuar:	án ^	OME	ITAF	NO.				
IV. SIMBOLOS * (Rodee con un circu	ılo la												_				
IV. SIMBOLOS * (Rodee con un circu aa at ax	ılo la ı	bu	са	cg	cn	СО	С	р	v	di	ef	е	m	es		od	
IV. SIMBOLOS * (Rodee con un circu	ılo la ı					со		р				е	_	es tb		od	

#### GEMO-008/Guías de Evaluación Médico Ocupacional

		1
as A	di 💮	mc O
Aorta ateroesclerótica	Distorsión pronunciada de una estructura intratoraxica	Mesotelioma
at O	ef a	pa Da
Engrosamiento pleural	Derrame pleural	Atelectasias en placa
ax ax	em 1	pb 3
Coalescencia de opacidades pequeñas <sup>1</sup>	Enfisema	Bandas parenquimatosas
bu D	3	
Bula(s)	Calcificación en cascara de huevo de los ganglios linfáticos hiliares o mediastínicos	Engrosamiento pleural de una cisura interlobular
cn A		px (1)
Cáncer: tumores malignos torácicos, excluido el mesotelioma	Fractura(s) costal(es) (reciente(s) o consolidada(s)	Neumotórax
cg S	hi 💮	
Adenopatías o nódulos (por ejemplo, granulomas) no neumoconióticos calcificados.	Adenopatías hiliares o mediastínicas no calcificadas	Atelectasias redondeadas
cn 💮	ho	тр 🔝 🏈
Calcificación en opacidades neumoconióticas pequeñas.	Pulmón en panal de abeja	Neumoconiosis reumatoide
·· \( \begin{picture}(10,0) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	id	B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Anormalidad del tamaño o la forma del	Diafragma mal definido	Tuberculosis
cp (a)	ih A	
Cor pulmonale	Contorno cardiaco mal definido	Otra enfermedad o anormalidad significativa
cv Coulded	kJ all	р
Cavidad	Líneas septales de kerley	Otra enfermedad o anormalidad significativa

## MINISTERIO DE SALUD Instituto Nacional de Salud CENSOPAS

